



Becur nalox™

SE Bruksanvisning

INNEHÅLL:

Nalox, 10 ml

INGREDIENSER


Propylenglykol, karbamid, mjölkysra, vatten, natriumhydroxid

BESKRIVNING

Nalox är en klar, färglös vätska i en plasttub med silikonspets som underlättar applicering på nageln. Nalox är fritt från konserveringsmedel och parfym. Ingredienserna är helt biologiskt nedbrytbara.

INDIKATION

Nalox behandlar naglar angripna av nagelsvamp (onykomykos) eller psoriasis och förbättrar utseendet av missfärgade och skadade naglar. Nalox har en fysikalisk keratolytisk effekt och bryter ned de svampceller som vanligen orsakar nagelsvamp. Nalox ger en slättare nagelyta och binder fukt i nageln. Genom att mikromiljön förändras och nagelytan stärks hålls nageln i gott skick. Nalox förbättrar naglarnas utseende, ofta med synbart resultat efter 2–4 veckors behandling.



ANVÄNDNING

Applicera Nalox en gång om dagen på de angripna naglarna, helst på kvällen strax före sänggåendet.

Håll tubens spets mot nageln. Tryck lätt på tuben och sprid ut lösningen med hjälp av spetsen.
Applicera ett tunt lager av lösningen på hela nagelytan. Det är viktigt att även applicera lösning under den fria nagelkanten på angripna naglar. Låt nageln torka i några minuter.

Kliniska tecken på förbättring kan vanligen ses efter 2–4 veckors behandling. Behandlingstiden varierar beroende på hur svårt angripna naglarna är, men i många fall krävs 3–6 månaders behandling för att uppnå tillfredsställande resultat. För bästa resultat, fortsätt behandlingen tills en normal nagel har vuxit ut.

Undvik att använda nagellack under behandlingen eftersom den önskade effekten av Nalox då minskar. Nalox verkar endast lokalt och kan därför användas under graviditet och amning. Det finns begränsad erfarenhet av användning på barn. Rådfråga därför din läkare innan behandling av barn påbörjas.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon eller slemhinnor. Använd inte Nalox om du är allergisk mot något av innehållsämnen.

EVENTUELLA BERVERKNINGAR

Övergående lättare irritation av intilliggande hud samt missfärgning av nageln kan förekomma hos en del patienter. I vissa fall kan delar av nageln släppa från den underliggande nagelbädden (onykols), vilket ibland leder till att den skadade nageldelen lossnar.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Använts före utgångsdatum som anges på tuben och ytterkartongen. Förvaras i +2 °C till +25 °C, ej i direkt solljus. Får ej frysas.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Tillverkare:

Moberg Pharma AB , Gustavslundsv. 42,
167 51 Bromma, Sverige
www.mobergpharma.se

Distributör SE:

Meda OTC AB
Box 906, 170 09 Solna, Sverige
www.nalox.se

Distributör FI:

Meda Oy
Vaisalavägen 4
02130 Esbo, Finland

Patentnr. EP 0785714 B2
Medicinteknisk produkt klass IIa

Datum för bruksanvisning: Denna text ändrades senast i maj 2014.

CE 0086

83-1002-07



Becur nalox™

① Käyttöohjeet

SISÄLTÖ:

Nalox, 10 ml

AINESOSAT

Propyleeniglykoli, karbamidi, maitohappo, vesi, natriumhydroksidi


TUOTTEEN KUVAUS

Nalox on kirkas väritön neste muoviputkilossa, jossa on aineen levittämistä helpottava silikonikärki. Nalox ei sisällä sääilöntäaineita eikä hajusteita. Ainesosat hajoavat luonnossa.

KÄYTÖÄIHEET

Nalox hoitaa kynsisienen (onykomykoosi) tai psoriaasin vaurioitamia kynsiä ja parantaa värjätyneiden ja vioittuneiden kynsien ulkonäköä. Naloxilla on fysikaalinen keratolyttinen vaikutus, ja se hajotaa sienisoluja, jotka tavallisesti aiheuttavat kynsiseniä.

Nalox silottaa kynnen pintaa ja sitoo kynteen kosteutta. Se pitää kynnet hyvässä kunnossa muuttamalla kynnen mikroympäristöä ja vahvistamalla kynnen pintaa. Paranemisen ensimmäiset merkit alkavat yleensä näkyä 2–4 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta.



KÄYTTÖ

Levitä Naloxia vaurioituneille kynsille kerran päivässä mieluiten illalla juuri ennen nukkumaanmenoa.

Pidä putkilon kärkeä kynttä vasten. Purista putkiloa kevyesti ja levitä liuos kärjen avulla.

Levitä ohut kerros liuosta koko kynnelle.

On tärkeää, että liuosta levitetään myös vaurioituneen kynnen reunan alle. Anna kynnen kuivua muutaman minuutin ajan.

Kliinisiä paranemisen merkkejä voi nähdä jo 2–4 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Hoidon kesto vaihtelee kynsivaurion mukaan, mutta monissa tapauksissa hyväksytävien tulosten saaminen edellyttää 3–6 kuukauden hoitoa. Paras tulos saadaan, kun hoitoa jatketaan niin kauan, että uusi terve kynsi on kasvanut.

Hoidon aikana on vältettävä kynsilakan käyttöä, koska se heikentää Naloxin vaikutusta. Nalox toimii vain paikallisesti, joten sitä voidaan käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana. Tuotteen käytöstä lapsille on vain vähän kokemusta. Tuotteen käytöstä lapsen hoitoon on neuvoteltava lääkärin kanssa.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Vain ulkoiseen käyttöön. Vältä aineen joutumista silmiin tai limakalvoille. Älä käytä Naloxia, jos olet allerginen jollekin sen ainesosalle.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Joillakin potilailla on havaittu ohimenevää lievää ihoärsytystä aivan kynnen vieressä sekä kynsien värjääntymistä. Kynsi voi myös löytyä ja irrota alla olevasta kynspedistä (onykolyysi) niin, että vaurioitunut kynnen osa saattaa lopulta irrota kokonaan.

SÄILYVYS JA SÄILYTYS

Käytettävä putkilossa ja pakkauksessa mainittuun viimeiseen käyttöpäivään mennessä. Säilytetään +2 °C – +25 °C. Suojattava suoralta auringonvalolta ja jäätymiseltä. Ei lasten ulottuville.

Valmistaja:

Moberg Pharma AB , Gustavslundsv. 42,
SE-167 51 Bromma, Ruotsi
www.mobergpharma.se

Jakelija (FI): Meda Oy, Vaisalantie 4,
02130 Espoo, Suomi
www.nalox.fi

Patentinumero EP 0785714 B2
Tuoteluokan Ila terveydenhuollon tarvike

Tuotetietojen päiväys: Teksti on tarkistettu toukokuussa 2014.



83-1002-07